

İmal
Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No: 21.04.2014/9641

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasında ki Süre
Elma	Avrupa kırmızıörümceği (<i>Panonychus ulmi</i>)	50 ml/100 L su Larva, nimf ve ergin	14 gün
*Bağ	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	75 ml/100 L su Larva, nimf ve ergin	14 gün
Domates	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	75 ml/100 L su Larva, nimf ve ergin	14 gün
Fasulye	Kırmızıörümcekler (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Tetranychus cinnebarinus</i>)	75 ml/100 L su Larva, nimf ve ergin	14 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kaptan bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakiler karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:Uygulama öncesi uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır.Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır.Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamalıdır.

 **PlatinKimya**
BANDERO

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	21A	AKARİSİT (Kırmızı örümcek ilacı)
-------	-----	--------------------------------------

50 g/L Fenpyroximate

Önce etiketi okuyunuz

Evde kullanmayınız .

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç

bir şey yemeyiniz, içmeyiniz.Sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 Gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Özel bir zehirlenme belirtisi yoktur.

Genel belirtiler, başlangıçta mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishaldir.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ TEL (UZEM) : 114



25 Temmuz 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

NET MİKTARI :
BRUT AĞIRLIĞI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI :

İÇİNDEKİLER
Fenpyroximate
ZARARLILIK İŞARETLERİ :



UYARI KELİMESİ : Tehlikeli madde olarak tanımlanmamıştır.

ZARARLILIK İFADELERİ

Tehlikeli madde olarak tanımlanmamıştır.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişmeyeceği yerde saklayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P301+P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P501 İçerdiği kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin. EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

BANDERO, kontakt etkili olduğundan kültür bitkilerinin hepsinde iyi bir kaplama sağlanacak şekilde yapılması gerekir. **Bandero Kırmızı örümceklerin hareketli dönemlerine etkilidir.**

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elma-Avrupa kırmızıörümceği: Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Domates ve fasulyede Kırmızıörümcekler:

Fasulyede yaprak başına ortalama 5 adet, domates ise 3 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Bağ-İkinoktalı kırmızı örümcek: Yayılış gösterdiği bağ alanları gözlem altında tutulmalı, bir yaprakta 5-8 adet zararlı bulunduğu kimyasal mücadele önerilir. Birinci uygulamada kullanılan ürünün etki süresi bitiminden itibaren yapılan sayımlarda, zararlı yoğunluğu eşikğin üzerinde çıkarsa, ikinci uygulama yapılır. Hasattan önce yapılan uygulamalarda, kullanılan akarisitın bekleme süresi dikkate alınarak uygulamaya son verilir. Şayet zarar devam ediyorsa hasattan sonra da uygulama yapılabilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

BANDERO adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 21A olarak sınıflandırılmış bir akarisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **BANDERO** nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 21A) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce mutlaka ön karışım testi yapılmalıdır..



SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	21A	AKARİSİT (Kırmızı örümcek ilacı)
-------	-----	--------------------------------------

50 g/L Fenpyroximate

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (Serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü(tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veyahatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadıklarında eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA :

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TIC.A.Ş

Maslak Mah Ahi evran cad. Polaris Plaza Apt

No :21 /26 Sarıyer /İstanbul

Tel : (0 212) 346 0777 (pbx) Fax : (0212) 3460778

ÜRETİM TESİSİ:

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde

No : 38 Doşemealtı/ANTALYA

Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ :

Yutulması halinde

Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.

Ürün ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

Göz ile temas halinde

Göze değmişse en az 15 dakika bol suyla yıkayınız.

Deri ile temas halinde

Ürünle temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız. İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız.

Solunması halinde

Hastayı açık havaya çıkarınız. Gerekirse oksijen veriniz suni solunum yapınız. Doktor çağırınız

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ :

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ(UZEM) TEL: 114



25 Temmuz 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

