

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Sarj No:
Ruhsat tarih ve No.su : 07.10.2015/10360

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Kontrol Ettiği Yabancı Ot	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre
Buğday	Kandamlası (<i>Adonis aestivalis</i>) Boyacı papatyası (<i>Anthemis tinctoria</i>) Kokar ot (<i>Bifora radians</i>) Peygamber çiçeği (<i>Centaurea depressa</i>) Köygöçüren (<i>Cirsium arvense</i>) Tarla hazeranı (<i>Consolida regalis</i>) Yabancı havuç (<i>Daucus carota</i>) Uzun süpürge otu (<i>Descurainia sophia</i>) Boynuzlu yoğurt otu (<i>Galium tricornutum</i>) Kıraç ıtırı (<i>Geranium stepporum</i>) Sarkık meyveli yavruağzı (<i>Hypocoum pendulum</i>) Ballıba ba (<i>Lamium amplexicaule</i>) Tıbbi taşkesen otu (<i>Lithospermum officinale</i>) Yabancı turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>) Meryem dikenini (<i>Silybum marianum</i>) Yabancı hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Kuş otu (<i>Stellaria media</i>) Adi fiğ (<i>Vicia sativa</i>)	3 g/da Yabancı otların genç ve aktif büyüme dönemlerinde buğdayın kardeşlenme devresinin sonuna kadar kullanılır.	56 gün
	Taşkesen otu (<i>Buglossoides arvensis</i>) Şahtere=Hakiki şahtere(<i>Fumaria officinalis</i>)	3 g/da + %0.25 V/V Agral	56 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için uygulama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamız.

PlatinKimya

DEGLAROT WG

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

Grubu	O,4	B,2	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	-----	-----	--------------------------------

%30 Aminopyralid + %15 Florasulam

Önce Etiket Okuyunuz.
Evdde Kullanmayınız.
Çocuklardan, Gıda Ve Hayvan Yemlerinden Uzak Tutunuz.
Bitki Koruma Ürününün Uygulanması Sırasında Hiçbir Şey Yemeyiniz, İçmeyiniz, Sigara Kullanmayınız.
Bitki Koruma Ürünü Uygulanmış Sahaya 1 Gün İnsan Ve Hayvan Sokmayınız.
İnsan Ve Çevre Sağlığı Üzerine Riskleri Önlemek İçin, Tavsiye Edildiği Şekilde Ve Tavsiye Edildiği Dozda Kullanınız.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

Dr. Yunus BAYKAL
Genel Müdür Yardımcısı

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ TEL
(UZEM) : 114

28 Ocak 2019
TARİHİNDE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net Miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER

Aminopyralid + Florasulam
ZARARLILIK İŞARETLERİ:



Uyarı Kelimesi: **DİKKAT**

ZARARLILIK İFADELERİ

H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P281 Kişisel koruyucu ekipman kullanınız.
P301+P312 Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayınız.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yliz koruyucu kullanınız.
P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliğe göre bertaraf ediniz.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.

Platin Kimya
Müşteri Hizmetleri ve Dış Ticaret A.Ş.
Y. ARSLAN
Genel Müdür Yardımcısı

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

DEGLAROT WG, Çıkış sonrası yabancı otların 2-8 yapraklı olduğu dönemde hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar kullanılır. Hububatın sapa kalktığı devreden sonra kullanılması tavsiye edilmez. Aşırı yağış dönemi ardından suya doymuş toprakta kullanmayınız. Kültür bitkisi ve yabancı otların kuraklık, soğuk, aşırı yağış vb nedenlerle stres altında bulunduğu koşullarda uygulama yapılmamalı, stres koşulları ortadan kalkıncaya kadar beklenmelidir. İyi bir etki, iyi bir kaplama ilaçlama ile elde edilir. Motorlu sırt atomizörü hariç her çeşit aletle atılabilir.

MÜNEVEBE BİTKİLERİ

DEGLAROT WG, uygulanan tarlaya:

1 ay sonra: Tahıllar, mısır, sorgum sudan otu

Aynı yıl sonbahar: kışlık tahıllar, kışlık, kanola, mısır, sorgum sudan otu

Bir sonraki ilkbahar: Soğan, yazlık hububatlar, yazlık kanola, ayçiçeği, pamuk, patates, şeker pancarı, yonca, havuç, rezene, keten tohumu

14 aydan sonra: Mercimek, nohut, soya fasulyesi, tarla fasulyesi, bezelye ekilebilir,

Duyarlı mahsuller için, güvenli görülen ekim aralıkları iklim koşulları ve

tarım uygulamalarını bağlı olarak değişebilir münavebe bitkileri konusunda daha fazla bilgi için firma yetkililerini arayınız.

UYGULAMA SONRASI SAP VE SAMAN YÖNTEMİ:

DEGLAROT WG, Tahılların sap ve samanlarında biriktiginden, kalıntılarını duyarlı münavebe bitkilerini etkileyebilir.

-DEGLAROT WG uygulanmış tahılların sap ve samanını pulluklu toprağa karıştırınız.

-DEGLAROT WG uygulanmış tahılların sapı ve samanını veya bunları tüketen hayvanların gübrelerini kompost yapımı, mantar üretimi veya malçlama amacıyla kullanmayınız

-DEGLAROT WG uygulanmış tahılların sap ve samanını veya bunları tüketen hayvanların gübrelerini ve/veya bu gübreleri içeren kompost gibi materyalleri ekilebilir arazide veya seralarda mercimek, bezelye, yonca gibi baklagil bitkilerinin ve çiçek, sebze, bağ meyve gibi bahçe bitkilerinin yetiştiriciliği için kullanmayınız.

DİRENÇ YÖNETİMİ: **DEGLAROT WG** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup O,4; B,2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **DEGLAROT WG** 'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup O,4; B,2 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyuluyorsa, ön karışım testi yapılması önerilir.

PlatinKimya

DEGLAROT WG

Suda Dağılabilen Granül (WG)

Grubu	O,4	B,2	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	-----	-----	--------------------------------

%30 Aminopyralid + %15 Florasulam

İLK YARDIM ÖNEMLERİ:

Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse etiketi gösterin).

Yutulması halinde; Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz. İlaç ambalajı ve etiketini birlikte götürünüz.

Göz ile temas halinde; Göze değmişse en az 15 dakika bol suyla yıkayınız.

Deri ile temas halinde; İlaçla temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız. İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız.

Soluması halinde; Hastayı açık havaya çıkarınız. Gerekliyse oksijen veriniz suni solunum yapınız. Doktor çağırınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulayınız.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

-Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

-Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

-Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

-Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.

-Balıklara zehirlidir, yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız

-En iyi etki yabancı otların gerçek ve Yapraklarının görüldüğü, hızlı büyüme içinde olduğu ve üstlerinin hububat tarafından kapatılmadığı zaman yapılan ilaçlamalardan alınır.

-Tarla bitiminde dönüş yaparken üst üste ilaçlama yapmaktan kaçınınız.

-Olumsuz meteorolojik koşullar parazit saldırısı vb nedenlerle mahsulün zarar görmesi durumunda

DEGLAROT WG uygulamasından bir ay sonra mısır sorgun ve diğer buğdaygillerin ekilmesi mümkündür.

Mütekip mahsulleri ekmeden önce toprağın mutlaka pullukla derine sürülmesi gerekir.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza Apt No :21/26
Sarıyer /İstanbul

TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi I.Kısım I.Cadde No: 38
Döşemealtı/ANTALYA

Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ TEL



28 Ocak 2019
TARİHİ: 28 Ocak 2019
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Platin Kimya
MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş