

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Sarı No:
Ruhsat tarih ve No.su :22.12.2017/11006

KULLANILACAGI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı organizma Adı	Uygulama Dozu	Son uygulama ile hasat arası süre
Domates	Erken yaprak yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	200 g/ 100 L su	14 gün
	Bakteriyel benek hastalığı (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>)	200 g/ 100 L su	14 gün
Elma	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	200 g/ 100 L su	21 gün
Bağ*	Mildivö (<i>Plasmopara viticola</i>)	150 g/ 100 L su	21 gün
	Ölököl (<i>Phomopsis viticola</i>)	150 g/ 100 L su	21 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışımı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suya tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON : Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamızdır.



MANCO 75 WG

Suda Dağılılabir Granül (WG)

Grup	M3	Fungisit (Mantar ilacı)
------	----	----------------------------

%75 Mancozeb

Önce etiketi okuyunuz
Evide kullanmayınız
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 Gün insan ve hayvan sokmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Göz, burun, boğaz ve deride tahriş, baş dönmesi ve ağrı, halsizlik, net görme, mide bulantısı

Net Miktar :
Brüt Ağırlığı :
Perakende Satış fiyatı (K.D.V Dahil) :

İÇİNDEKİLER

Mancozeb
ZARARLILIK İŞARETLERİ :



UYARI KELİMESİ : DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H361d Cilt ile teması halinde doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

ÖNLEM İFADELERİ

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P202 Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmeden elleçlemeyin.
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Arlara zehirlidir. Bitki koruma ürününü çiçeklenme zamanı uygulayınız. Balıklara ve suda yaşayan organizmalara zehirlidir., sulara bulaştırmayınız. Tavsiye edilen bitkilerde, verilen dozlarda uygulandığında fitotoksik etki görülmez.
Bitki koruma ürününü orijinal ambalajında ağız kapalı olarak serin ve kuru bir yerde gıda maddelerinden ayrı, iyi hazırlanan, güneş ve rutubetten uzakta kuru ve serin bir yerde muhafaza ediniz.
Ateş kıvılcım ve aşırı sıcaktan koruyunuz. +25 °C' yi geçmemelidir.
Boş bitki koruma ürünü ambalajını usulüne uygun olarak imha ediniz.

A



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

02 Aralık 2019

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elma karaleke

1.uygulama : Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3.uygulama : Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce.

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürünlerinin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Bağda mildiyö : İlk uygulama sürgünlerin 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1.uygulamanın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

Bağda ölükol

Yaz uygulaması; 1.uygulama: Sürgünler 2-3 cm olduğunda

2.uygulama: Sürgünler 8-10 cm olduğunda, 3.uygulama Sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Domateste erken yaprak yanıklığı

Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyirine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Domates bakteriyel benek :

Domateste bakteriyel benek ile mücadele yeşil aksam uygulamaları şeklinde yürütülür. Yeşil aksam uygulamaları, fidelikte veya tarlada hastalık belirtileri görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama şeklinde yapılmalıdır. Seralarda uygulama sayısı artabilir

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

MANCO 75 WG isimli Bitki Koruma Ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M3 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmalarına sahip Bitki Koruma Ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için, **MANCO 75 WG** 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M3 harici) Bitki Koruma Ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

MANCO 75 WG yaygın olarak kullanılan çoğu fungusit, insektisit ve büyümeyi düzenleyiciler ile karışabilir. Tank karışımı hazırlarken uygulamadan önce karışım tablolarına başvurulmalıdır. **MANCO 75 WG** cymoxanil, captan, folpet, fosetyl-aluminium gibi aktif maddeli bitki koruma ürünleri ile karışabilir.



MANCO 75 WG

Suda Dağılılabir Granül (WG)

Grup	M3	Fungisit (Mantar ilacı)
------	----	----------------------------

%75 Mancozeb

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Yutulması halinde

Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz. İlaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

Göz ile temas halinde

Göze değmişse en az 15 dakika bol suyla yıkayınız.

Deri ile temas halinde

İlaçla temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız. İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız.

Solunması halinde

Hastayı açık havaya çıkarınız. Gerekirse oksijen veriniz suni solunum yapınız. Doktor çağırınız

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulanır

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ TEL (UZEM) : 114

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (Serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörür(tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma Bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadıklarında eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ ÜRETİCİ FİRMA:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş

Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza Apt

No :21/26 Sarıyer /İstanbul

TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde

No: 38 Döşemealtı/ANTALYA

Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

Mustafa ARSLAN
Genel Müdür Yardımcısı

Mustafa ARSLAN
Genel Müdür Yardımcısı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

02 Aralık 2019