

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No.su: 06.12.2012/8940

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Buğday Arpa	Kandamlası (<i>Adonis aestivalis</i>) İtalyan siğirdili (<i>Anchusa azurea</i>) Yatık boya kökü (<i>Asperugo procumbens</i>) Taşkesen otu (<i>Buglossoides arvensis</i>) Sarı ot (<i>Boreava orientalis</i>) Rum yalancı keteni (<i>Camelina rumelica</i>) Yabani tere (<i>Cardaria draba</i>) Boynuz otu (<i>Cerastium dichotomum</i>) Uzun süpürge otu (<i>Descurainia sophia</i>) Kıraç itiri (<i>Geranium stepporum</i>) Sarkık meyveli yavruağzı (<i>Hypocoum pendulum</i>) Yabani çivit otu (<i>Isatis tinctoria</i>) Trakya hardalı (<i>Neslia apiculata</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Süpürge otu (<i>Sisymbrium altissimum</i>) Kaba fiğ (<i>Vicia narbonensis</i>) Adi fiğ (<i>Vicia sativa</i>)	50 ml/da	--
Buğday Arpa	Tarla papatyası (<i>Anthemis fumariifolia</i>) Saka diken (<i>Carduus pycnocephalus</i>) Tarla hazerani (<i>Consolida regalis</i>) Boynuzlu yoğurt otu (<i>Galium tricoratum</i>) Çoban değneği (<i>Polygonum bellardi</i>) Tarla düğün çiçeği (<i>Ranunculus arvensis</i>) Meryem diken (<i>Silybum marianum</i>) Parmaklı yavşan otu (<i>Veronica triphyllos</i>)	60 ml/da	--
Buğday Arpa	Kekre (<i>Acroptilon repens</i>) Kokar ot (<i>Bifora radians</i>) Peygamber çiçeği (<i>Centaurea depressa</i>) Köygöçüren (<i>Cirsium arvense</i>) Doğu ballıbabası (<i>Wiedemannia orientalis</i>)	70 ml/da	--
Mısır *	İmam pamuğu (<i>Abutilon theophrasti</i>) Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Uzun loğusa otu (<i>Aristolochia maurorum</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Yatık sirken (<i>Chenopodium vulvaria</i>) Peygamber çiçeği (<i>Centaurea depressa</i>) Dil kanatan (<i>Galium aparine</i>) Gecesefası (<i>Ipomoea stolonifera</i>) Adi soda otu (<i>Salsola kali</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	70 ml/da	--
Mısır *	Kekre (<i>Acroptilon repens</i>) Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>)	80 ml/da	--

* Hibrit mısır tohumu üretiminde ve şeker mısırı yetiştiriciliğinde kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

14 Ocak 2022 TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

PlatinKimya
MASERATTI

Suspo-Emülsiyon (SE)

Grubu O,4 B,2 Herbisit (Yabancı ot İlacı)

**452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl Ester (EHE) +
6,25 g/l Florasulam**

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR**

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Bulantı, terleme, baş ağrısı, baş dönmesi ve uyuşukluk görülebilir. Deri ve gözde tahrişe sebep olabilir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Ümit Uğur BAHÇE
Daire Başkanı V.

Net Miktarı:
Azami Per. Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER:

2,4-D-2-ethylhexyl ester, Florasulam

ZARARLILIK İŞARETLERİ :



**UYARI KELİMESİ : DİKKAT
ZARARLILIK İFADELERİ**

H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
ÖNLEM İFADELERİ
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.
P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayınız.
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR:**

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı uygulamayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Boş bitki koruma ürünlerinin ambalajlarını başka amaçla kullanmayınız

PLATIN KİMYA
Mümeselliği ve Tic. A.Ş.
AYŞE TÜMAY
Ziraat Yüksek Mühendisi

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

MASERATTI-uygulamalarında en iyi etki, yabancı otların gerçek yapraklarının görüldüğü, hızlı büyüme içinde olduğu ve üstlerinin hububat tarafından kapatılmadığı zaman yapılan uygulamalardan alınır.

Hububat (Buğday, arpa): Yabancı otların çıkışını tamamladığı devreden, hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar geçen dönemde kullanılır. Hububatın sapa kalktığı devreden sonra kullanılması halinde istenen etki alınmaz ve tavsiye edilmez. Dondan sonra veya gece don beklentisi varsa uygulama yapmayınız.

Mısır: Mısır bitkisinin 3-5 yapraklı, yabancı otların çıkışını tamamladığı dönemde kullanılır. Uygulama sırasında ve sonrasında (7-10 gün), günlük ortalama sıcaklık 15°C'nin üzerine çıkarsa geniş yapraklı komşu kültür bitkileri zarar görebilir. Dolayısıyla bu dönemde sıcaklığın yüksek olduğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgelerinde kullanılması tavsiye edilmez.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

MASERATTI adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup O,4 + B,2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnci gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnci gelişimini geciktirmek için **MASERATTI** 'nı aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup O,4 + B,2 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.



PlatinKimya
MASERATTI

Suspo-Emülsiyon (SE)

Grubu	O,4	B,2	Herbisit (Yabancı ot İlacı)
-------	-----	-----	-----------------------------

**452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl Ester (EHE) +
6,25 g/l Florasulam**

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:**Yutulması halinde**

Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz. İlaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

Göz ile temas halinde

Göze değmişse en az 15 dakika bol suyla yıkayınız.

Deri ile temas halinde

İlaçla temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız.

İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız.

Solunması halinde

Hastayı açık havaya çıkarınız. Gerekliyse oksijen veriniz suni solunum yapınız. Doktor çağırınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Doktor yargısına göre destekleyici tedavi/bakım uygulanır.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadıklarında eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A. Ş
Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Polaris Plaza Apt.
No:21/26 Sarıyer /İstanbul
TEL: 0212 346 07 77 FAX: 0212 346 07 78
ÜRETİM TESİSİ:
PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A. Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım
1.Cadde No: 38 Döşemealtı/ANTALYA
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

PLATİN KİMYA
Müessesillik ve Dış Tic. A.Ş.
AYŞE TÜRKAL
Ziraat Yüksek Mühendisi

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

14 Ocak 2022
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Ümit Uğur BAĞÇE
Daire Başkanı



39