

İmal Tarihi :

Son Kullanma Tarihi :

Sarj No:

Ruhsat tarih ve No.su : 30.11.2018/11266

**KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR**

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Pamuk	*Yeşilkurt ( <i>Helicoverpa armigera</i> )	150 ml/da Larva ve yumurta	7 gün
	**İki noktalı kırmızıörmekçik ( <i>Tetranychus urticae</i> )	50 m/da Nimf ve ergin	
Elma	Elma içkurdu ( <i>Cydia pomonella</i> )	20 ml/100 L. su (larva)	3 gün
**Bağ	Salkım güvesi ( <i>Lobesia botrana</i> )	20 ml/100 L. su Larva	7 gün
Mısır	Mısırdaki bozkurt ( <i>Agrotis spp.</i> )	50 ml/ da (Larva)	14 gün
	Mısır koçankurdu ( <i>Sesamia spp.</i> )	30 ml/da (Larva) 15 gün ara ile 3 uygulama	
	Mısır kurdu ( <i>Ostrinia nubilalis</i> )	30 ml/da (Larva) 15 gün ara ile 3 uygulama	
Buğday	Süne ( <i>Eurygaster spp.</i> )	20 ml/da (1.-3.dönem nimf ve 4.-5. dönem nimf)	14 gün
	Hububat hortumlu böceği ( <i>Pachytichius hordei</i> )	25 ml/da (Ergin)	
	Ekin kamburböceği ( <i>Zabrus spp.</i> )	50 ml/da (Ergin) (yüzeysel uygulaması)	
Patates	Patates böceği ( <i>Leptinotarsa decemlineata</i> )	40 ml /da (Larva ve ergin)	3 gün
Domates	Yeşilkurt ( <i>Helicoverpa armigera</i> )	50 ml/da (larva)	3 gün

## LARIS TARIM REKOR 50 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP	3A	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
------	----	-----------------------------

50 g/L Lambda-cyhalothrin

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 Gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA  
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

Kullanılan ürünün boy ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Mukozayı tahriş eder. Ciltte yanma ve baş ağrısı, bulantı ve kusma olabilir.

**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114**

Net Miktarı :

Brüt Ağırlığı :

Perakende Satış fiyatı (K.D.V Dahil) :

**İÇİNDEKİLER**

Lambda-cyhalothrin ,emülgatör,Ksilen

**ZARARLILIK İŞARETLERİ :**



**UYARI KELİMESİ : TEHLİKE**

**ZARARLILIK İFADELERİ**

H301 Yutulması halinde toksiktir

H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H330 Solunması halinde öldürücüdür

H400 sucul ortamda toksiktir

H401 sucul ortamda toksiktir

**ÖNLEM İFADELERİ**

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz

koruyucu/üz koruyucu kullanınız

P281 Kişisel koruyucu ekipman kullanınız.

P301+310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR

DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU

veya doktoru/hekimi arayınız.

P391 Döküntüleri toplayınız

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf

edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri

önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.



**Hakan AYDOĞAR**  
Ziraat Mühendisi

09 Aralık 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



A N

Lahana	Lahana yaprakgüvesi ( <i>Plutella maculipennis</i> )	25 ml/da (larva)	2 gün
Şeker pancarı	Kalkan böcekleri ( <i>Cassida spp.</i> )	25 ml/da (nimf ve ergin)	3 gün
Zeytin	Zeytin güvesi /çiçekte ( <i>Prays oleae</i> )	15 ml/100 L su (larva)	3 gün
Antep fıstığı	Antepfıstığı psillidi ( <i>Agnosca pistaciae</i> )	20 ml/100 L su Nimf	7 gün
Fındık	Fındık kurdu ( <i>Curculio nucum</i> )	50 ml/da Ergin	3 gün

\* Akdeniz bölgesinde kullanılmaz

\*\* Sadece Ege Bölgesinde kullanılır.

\*\*\*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanacağı kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanılmalıdır.

#### KALİBRASYON :

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamızdır.

## LARIS TARIM REKOR 50 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP	3A	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
------	----	-----------------------------

50 g/l Lambda-cyhalothrin

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ :

##### Ağızdan alınması halinde

Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz. Hastayı kusturmaya çalışmayınız. İlaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

##### Göz ile temas halinde

Göz ile temas halinde en az 15 dakika bol suyla yıkayınız

##### Deri ile temas halinde

İlaçla temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız. Krem sürünüz.

##### Solunması halinde

Hastayı açık havaya çıkarınız. Sıcak ve sakın tutunuz. Gerekirse suni teneffüs yapınız. Doktor çağırınız.

**ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:** Özel bir antidotu yoktur. belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114**

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız. Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız. Bitki koruma ürününü kullanırken birşey yemeyiniz. Bütün bitki koruma ürünlerinde olduğu gibi uygulama sırasında mümkün olduğunca ürün ile temastan sakınınız. Ürün gözlerinize zarar verebilir. Gözünüze geldiğinde hemen yıkayınız. İlk yardım tedbirlerine bakınız. Ürünün buharını solumayınız. Ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

#### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (Serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

#### FİRMA BEYANI :

Orjinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadıklarında eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Hakan AYDOĞAR  
Ziraat Mühendisi

LARIS TARIM  
LARIS TARIM ÜRÜNLERİ  
İTH. VE TİC. LTD. ŞTİ.

09 Aralık 2019  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



A N



### **BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:**

**Pamuk yeşilkurta karşı** rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

**İki noktalı Kırmızı örümceklere karşı** mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklı olduktan sonra sürveylere başlanır.Zararlı yalnız tarla kenarında ve içinde lokal olarak bulunuyorsa,sadece bu kısımlar spesifik ilaçlar ile ilaçlanmalıdır.Zararlı tarlanın tamamına yayılması durumunda,yapılan sürveylerde yoğunluk yaprak başına Akdeniz bölgesinde 5 ,Ege ve Güney Anadolu bölgesinde 10 adet kırmızı örümceğe ulaşmış ise kaplama ilaçlama yapılmalıdır. Yaprak başına ortalama 10 adet kırmızı örümcek edildiğinde ilaçlama yapılır.

**Elma içkurdu** :Elma içkurdu'na karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir.Elma içkurdu mücadelesinde hedef,her dölde ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

**Bağ salkım güvesine karşı** salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir.Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşmış,düşmeye başlanmalı,etkili sıcaklık toplamı 1. Dölde 120 gün-derece,alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 °C ve üzerinde olmalı,bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir.Etkili sıcaklık toplamı 2. Dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı,asma fenolojisi 1.dölde çiçek tomurcuğu,2.dölde koruk,3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır.İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir.Her dölde bir uygulama yapılır.

**Mısır kurdu ve Mısır koçankurduna karşı** ilk yumurta tesbit edildiğinde uygulama yapılır.İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2. uygulama daha yapılır.

**Patates böceğine karşı** günlük ortalama sıcaklık 14-15°C'ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek,ocaklarda zararlıların yumurta,larva ,ergini ararın.herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir.Birinci dölde karşı uygulama yapılacaksa,bitkilerde ilk olgun larvalar(dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır.İkinci dölde uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir.Bu dönemde de,böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmez.Bununla birlikte,yapılan araştırmalar sonucunda patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu %20 oranındaki zarar,bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır.Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak %40'a kadar çıkmaktadır.

## **LARIS TARIM REKOR 50 EC**

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP	3A	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı )
------	----	------------------------------

50 g/l Lambda-cyhalothrin

### **RUHSAT SAHİBİ FİRMA :**

LARIS TARIM ÜRÜNLERİ İTH. VE TIC. LTD.ŞTİ.  
Ahi Evran Cad.Polaris Plaza No:1/25 Kat:4  
34398 Maslak / İSTANBUL -TURKEY  
Tel No. 0212 346 10 67 Fax No.0212 346 10 63

### **ÜRETİM TESİSİ :**

PLATİN KİMYA MÜM VE DİŞ TİC.A.Ş  
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde  
No : 38 Döşemealtı/ANTALYA  
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75



**Hakan AYDOĞAR**  
Ziraat Mühendisi



09 Aralık 2019  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

A N

**Buğday Ekin kamburböceği :** Yüzeysel uygulaması yapılır.

**Hububat hortumluböceği:** Topraktan çıkarıldıktan 10 gün sonra (Sapa kalkma dönemi) uygulama yapılır.

**Süne:** Süne tarlalara indikten sonra tarlada bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir..

**Domates Yeşilkurt :** Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünde girilip, tarlanın büyüklüğüne 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5'i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

**Lahana: Lahana yaprakgüvesine karşı :** Tarlaya köşegenleri doğrultusunda girilip her 10 adımda bir bitki kontrol edilir. Zarar belirtilerine yaygın olarak rastlandığında uygulamaya karar verilir.

**Zeytin güvesi:** Zararlımı çiçek dönünde uygulama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünü az olduğu yıllarda mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde %10 'dan fazla zarar görüldüğünde çiçek dönünde ilk keleklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dönüne bir uygulama yapılır: tercihen sadece meyve dönüne karşı uygulama yapılmalıdır. kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin %10'unda canlı "yumurta+larva olduğunda uygulama yapılır.

**Antepfıstığı psillidine karşı:** Haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fimajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

**DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ :** REKOR 50 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için REKOR 50 EC 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3A hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU :**

Uygulama için büyük miktarlarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

## LARIS TARIM REKOR 50 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP	3A	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
------	----	-----------------------------

50 g/l Lambda-cyhalothrin

**RUHSAT SAHİBİ FİRMA :**

LARIS TARIM ÜRÜNLERİ İTH. VE TIC. LTD.ŞTİ.

Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No: 1/25 Kat: 4

34398 Maslak / İSTANBUL - TURKEY

Tel No. 0 212 346 10 67 Fax No. 0 212 346 10 63

**ÜRETİM TESİSİ :**

PLATİN KİMYA MÜM VE DİŞ TİC. A.Ş

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 1. Cadde

No : 38 Döşemealtı/ANTALYA

Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75



Hakan AYDOĞAR  
Ziraat Mühendisi



09 Aralık 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

A N