

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Sarj No:
Ruhsat tarih ve No.su : 04.02.2016/10533

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Ayçiçeği	Farekulağı (<i>Anagallis arvensis</i>) Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Kırmızı çiçekli ballıbaba (<i>Lamium purpureum</i>) Çobançeşmesi (<i>Polygonum aviculare</i>) Yabani turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Kuş otu (<i>Stellaria media</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Yabani fiğ (<i>Vicia spp.</i>)	300 ml/da Ekimden hemen sonra (çıkış öncesi)
Havuç	Horoziböğü (<i>Amaranthus albus</i>) Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Çobançeşmesi (<i>Polygonum aviculare</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Yabani turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>)	250 ml/da Ekimden hemen sonra havuç toprak yüzüne çıkmadan önce
Patates	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Yeşil horoziböğü (<i>Amaranthus viridis</i>) Çobançantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Hakiki şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>) Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>)	200-250 ml/da Dikimden sonra en geç 5 gün içinde hafif toprakta düşük, ağır toprakta yüksek doz uygulanır.

 **PlatinKimya**
TENLONTER 25 EC
Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	F1;12	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	-------	--------------------------------

250 g/l Flurochloridone

Önce Etiket Okuyunuz.
Evdde Kullanmayınız.
Çocuklardan, Gıda Ve Hayvan Yemlerinden Uzak Tutunuz.
Bitki Koruma Ürününün Uygulanması Sırasında Hiçbir Şey Yemeyiniz, İçmeyiniz, Sigara Kullanmayınız.
Bitki Koruma Ürünü Uygulanmış Sahaya 1 Gün İnsan Ve Hayvan Sokmayınız.
İnsan Ve Çevre Sağlığı Üzerine Riskleri Önemek İçin, Tavsiye Edildiği Şekilde Ve Tavsiye Edildiği Dozda Kullanınız.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR
Kullanılan Ürünün Boş Ambalajlarının İçine 1/4'üne Kadar Temiz Su Koyarak İyice Çalkalayınız. Çalkalama Suyunu İlaçlama Tankına Boşaltınız. Bu İşlemi 3 Sefer Tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ TEL:
0312 233 114

Net Miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:
İÇİNDEKİLER
Flurochloridone, Cyclohexanone, Ksilen
ZARARLILIK İŞARETLERİ:



Uyarı kelimesi: **DİKKAT**

ZARARLILIK İFADELERİ

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H332 Solunması halinde zararlıdır.
H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun.
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın
P501: İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

26 Şubat 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



 **PlatinKimya**
İlçimehmetiye ve Dış Ticaret A.Ş.


BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durundayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için uygulama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Tenlonter 25 EC Ayçiçeği ve havuçta ekimden sonra hemen (1-2 gün içerisinde) Patateste ise dikimden sonra en geç 5 gün içinde toprak yüzeyine uygulanır. Tenlonter 25 EC'den en yüksek etkiyi almak için ekimden veya dikimden önce toprak keseksiz olarak hazırlanmalıdır. Tenlonter 25 EC çıkmış yabancı otlara etkili olmadığından uygulama sırasında tarlada çıkmış yabancı ot bulunmamalıdır. İlaç uygulandıktan sonra ilaçlı tabakanın bozulmaması için zorunlu olmadıkça toprak işlenmemelidir. Patateste geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış öncesi olarak, hafif topraklarda düşük doz (200ml/da), ağır topraklarda yüksek doz (250 ml/da) kullanılmalıdır. İlaçlama yelpaze şeklinde püskürtme yapan (Tee-jet) meme ile 2.0-2.5 bar basınçla yapılmalıdır. İlaçlama öncesi tavsiye edilen dozun atılabilmesi için aletin ayarı yapılarak dekara ne kadar su kullanıldığı tespit edilmelidir. İlaçlama rüzgarsız havada yapılmalıdır. İlaçlama yapılırken aynı yerden üst üste geçilmemelidir. Havuç tohumlarının çimlenmesi için sulama gerekli ise uygulamadan sonra yağmurlama sulama yapılabilir.

DİRENÇ YÖNETİMİ: TENLONTER 25 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup F1; 12 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TENLONTER 25 EC 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F1;12 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma gerek duyuluyorsa, ön karışım testi yapılması önerilir.

26 Subat 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Ümit Uğur BAĞÇE
Daire Başkanı V.



PlatinKimya

TENLONTER 25 EC Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	F1;12	HERBİSİT (Yabancı Ot İlaç)
-------	-------	-------------------------------

250 g/L Flurochloridone

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse etiketi gösterin).
Yutulması halinde; Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz. İlaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.
Göz ile temas halinde; Göze değmişse en az 15 dakika bol suyla yıkayınız.
Deri ile temas halinde; İlaçla temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız. İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız.
Solunması halinde; Hastayı açık havaya çıkarınız. Gerekliyse oksijen veriniz suni solunum yapınız. Doktor çağırınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ TEL
(UZEM) : 114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

-Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
-Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
-Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
-Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
-Balıklara zehirlidir, yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.
-Soğan, Domates, Tütün, Kabakgiller (Kabak, Hıyar, Karpuz ve Kavun) ve Lahana giller (Lahana, Karnabahar ve Turp) ilaca karşı çok hassas olduklarından Tenlonter 25 EC kullanılan tarlaya 12 ay sonra ekilmelidir.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza Apt No :21/26
Sarıyer /İstanbul

TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde
No: 38 Döşemealtı/ANTALYA
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

Platin Kimya
Müessellik ve Dış Ticaret A.Ş.